

DESTETE PRECOZ PLUS

BOVINOS LECHE



COMPOSICIÓN CENTESIMAL

| | |
|-----------------------|----------|
| Proteína bruta (mín.) | 22,5% |
| Fibra cruda (máx.) | 8,0% |
| Grasa (mín.) | 3,6% |
| Calcio (mín.-máx.) | 0,9-1,2% |
| Fósforo (mín.-máx.) | 0,5-0,8% |
| Minerales totales | 7,4% |
| Humedad | 12,0% |
| Lasalocid | 28,3 ppm |

CARACTERÍSTICAS

Alimento Iniciador completo desarrollado para suministrar a terneros desde los primeros días de vida. Su fórmula contiene altos niveles de nutrientes, cereales y proteínas de alto valor biológico además del agregado de un concentrado de levaduras vivas y pared de levaduras (*Saccharomyces cerevisiae*) rica en mananoligosacaridos y betaglucanos (1,3 y 1,6) que permiten promover un adecuado desarrollo corporal y digestivo durante el primeros meses de vida, logrando así un rápido paso de la etapa de lactante a rumiante.

Fortalece la salud intestinal y el sistema inmune de manera natural, dota a los animales de una mejor capacidad de absorber nutrientes además de ayudar a sobrellevar de mejor manera las condiciones climáticas y de estrés.

- Adhiere un amplio espectro de patógenos (E.coli, Salmonella) gracias a su alto contenido de mananoligosacaridos previniendo su adhesión a las vellosidades intestinales.
- Mejora la respuesta humoral y celular durante los desafíos.
- Incrementa el poder reductor del rumen:
 - Bacterias consumidoras de lactato
 - Bacterias celulíticas
- Incrementa la digestión de fibra
- Incrementa el pH Ruminal evitando la acumulación de ácido láctico (previene la acidosis)

INDICACIONES DE USO

Administrar como un alimento más, respetando las cantidades sugeridas en sustitución de la leche.

ESPECIES Y CATEGORÍAS DE DESTINO

Terneros de guacheras, destetes precoz e hiperprecoz en tambo.

CONTRAINDICACIONES, PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

No administrar a equinos, aves o cerdos.

PRESENTACIÓN

Pelleteado en bolsas de 25Kg o a Granel.

DESTETE PRECOZ PLUS



INOCUIDAD
ALIMENTARIA
BPM

DC QAB P-027/1
IRAM 14108-2013

BOVINOS LECHE

DOSIFICACIÓN

Terneros de tambo en crianza artificial: administrar en forma gradual e ir sustituyendo la leche por balanceado. Comenzar la primer semana administrando 200grs/animal/día.

TERNEROS DE RAZAS LECHERAS EN SISTEMA DE CRIANZA ARTIFICIAL. DESLECHE 30 DÍAS

| DÍAS EN ESTACA | LECHE/ SUSTITUTO | DEST. PRECOZ BALANCEADO | BALANCEADO TERNERO | HENO | AGUA |
|----------------|------------------|-------------------------|--------------------|------|------|
| 1 a 6 | 4 Litros | 200gr/Cab/Días | - | No | Sí |
| 7 a 11 | 4 Litros | 300gr/Cab/Días | - | No | Sí |
| 12 a 17 | 4 Litros | 400gr/Cab/Días | - | No | Sí |
| 18 a 25 | 2 Litros | 650gr/Cab/Días | - | No | Sí |
| 26 a 33 | 2 Litros | 800gr/Cab/Días | - | No | Sí |
| 34 a 41 | 2 Litros | 1.000gr/Cab/Días | A voluntad | No | Sí |
| 41 a 48 | 1,5 Litros | 700gr/Cab/Días | A voluntad | No | Sí |
| 49 a 55 | - | - | A voluntad | Sí | Sí |